



TIPO	PROMOTOR DEL CRECIMIENTO
COMPOSICIÓN	INDUCTOR NATURAL Promotor fenológico 10.00 mg/L PROMOTORES FENOLÓGICOS N..... 0.50% P..... 1.80 % K..... 1.30 % PROMOTORES FENOLÓGIICOS Ca..... 800 mg/L Mg.....200 mg/L B..... 0.24 mg/L Zn.....4.20 mg/L Mn.....8.40 mg/L Fe.....13.60 mg/L Cu..... 0.20 mg/L Co..... 0.30 mg/L Mo..... 0.38 mg/L AMINOÁCIDOS Ácido aspártico..... 25 g/L Ácido glutámico..... 70 g/L Serina..... 13.8 g/L Histidina..... 2.5 g/L Glicina..... 112.5 g/L Treonina..... 6.3 g/L Alanina..... 33.8 g/L Arginina..... 17.5 g/L Tirosina..... 2.5 g/L Cistina..... Trazas Valina..... 3.8 g/L Metionina..... 2.5 g/L Fenilalanina..... 6.3 g/L Isoleucina..... 2.5 g/L Leucina..... 6.3 g/L Lisina..... 31.3 g/L Hidroxiprolina..... 26.3 g/L Prolina..... 36.3 g/L Vitamina B1..... 0.98 g/L Vitamina B2..... 0.98 g/L
FORMULACIÓN	Líquido Soluble

FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
CARACTERISTICAS	FRUTONE, es un INDUCTOR BIOESTIMULANTE NATURAL, que se manifiesta acelerando el desplazamiento de los nutrientes dentro del sistema vegetal. Mejora la uniformidad, calidad y cantidad de los frutos cosechados y reduce los desórdenes fisiológicos que sucede en las frutas de mayor tamaño. FRUTONE contiene promotores naturales encapsulados con aminoácidos FRUTONE logra plantas vigorosas, así como plántulas bien conformadas, capaces de tolerar condiciones adversas “estresantes” que estén fuera de nuestro control y que afecten el cuajado del fruto. FRUTONE aumenta la división celular en los frutos pequeños y semillas, que en presencia de abundante calcio aumentará la retención de frutos.
PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS	Aspecto: Líquido Color: Marrón oscuro Olor: Característico pH: 8.5 – 9.5 Solubilidad: Soluble en agua Densidad: 1.03 – 1.05 g/ml Reactividad: No inflamable

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	L/ha	
Mandarina, naranja, limón, toronja, caña de azúcar	0.5 - 1	3	1º: Después del cuajado de frutos 2º: Después del riego de reinicio (para incrementar el sistema radicular)
Manzano, durazno, café melocotonero, pera, ciruelo	0.5 - 1	2	1º: Después de la floración y cuajado de los primeros frutos
Lúcuma, cacao, mango, pato, olivo	0.5 - 1	3	1º: Después de la floración y cuajado de los primeros frutos
Vid	0.5 - 1	3	1º: Inicio del brotamiento 2º: Después de la primera floración 3º: Cuando están en bayas Repetir cada 7 días hasta la cosecha.
Leguminosas y hortalizas, frijol, pallar, maní, arveja, garbanzo, papa, habas, vainita, rocoto, tomate, páprika, pimientos, ají y espárrago	0.5 - 1	2	1º: Inicio de floración Repetir cada 15 días hasta la cosecha.
Alcachofa	0.5 - 1	2 - 3	1º: Inicio de la aparición del capítulo Repetir después de cada corte
Cebolla, ajo, cebolla china y porro	0.5 - 1	2	1º: Al inicio del bulbeo

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN	FRUTONE se prepara diluyendo la dosis indicada según el cuadro de usos en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.
COMPATIBILIDAD	No mezclar en soluciones con aceites, azufres, ni cúpricos. Es compatible con los insecticidas y fungicidas.
PRECAUCIONES EN EL MANEJO	Evite comer, beber o fumar cuando manipule o aplique el producto. Guardar en los envases originales en lugares frescos y lejos del alcance de los niños. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. Almacenar en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado. Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón. En caso de emergencia llamar al teléfono: Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita)
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES	Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio. 