

SAFIRO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Insecticida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Chlorfenapyr..... 240 g/L
GRUPO QUÍMICO	Pyrroles
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA N° 2554 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Amarillo Moderadamente peligroso. Dañino
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	SAFIRO es un insecticida que actúa por ingestión y contacto. Presenta buena acción translaminar, pertenece al grupo de los pyrroles que actúa a nivel de inhibición de la fosforilación oxidativa en la mitocondria.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.1-0.125	-	15	0.01

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Para la preparación de la mezcla del producto SAFIRO, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto agitando constantemente, complete luego hasta el volumen deseado. SAFIRO se aplica utilizando equipos de aspersión a motor o manual.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes. -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Aplicar cuando la plaga se encuentre en los primeros estadios larvales. El número de aplicaciones depende del grado de infestación de la plaga. Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.
COMPATIBILIDAD	Compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de reacción alcalina y los agentes fuertemente oxidantes.
FITOTOXICIDAD	SAFIRO no es fitotóxico a la dosis y uso recomendados.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita)</p>