

## TILOX

### 1- Clasificación farmacológica:

Antibacteriano.

### 2- Forma farmacéutica:

Polvo Soluble

### 3- Presentaciones:

10 g, 12 g, 15 g, 100 g, 1 Kg,

5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg.

### 4 - Tipo de envase:

SOBRES :10 g, 12 g, 15 g, 100 g

BOLSA TRILAMINADO ALUMINIZADA: 1Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg,

CAJA(S): 25 und, 30 und, 50 und, 55 und

### 5- Envase secundario:

Caja de cartón con impresión flexográfica.

### 6- Composición cualitativa y cuantitativa:

Cada 100 g contiene:

PRINCIPIO ACTIVO:

Tilosina Tartrato..... 20 g

Doxiciclina..... 3 mg

Excipientes c.s.p. .... 100 g

### 7- Indicaciones:

TILOX, es un antibacteriano para ser administrado en el agua de bebida, indicada para el tratamiento de infecciones respiratorias y gastrointestinales ocasionadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas

### 8- Especies de destino:

Aves, Porcinos

### 9- Advertencia y Precauciones:

No combinar con antibióticos, bactericidas.

# FICHA TÉCNICA



## 10- Dosificación:

Aves

2 g de TILOX / 1 Lt de agua.

2g de TILOX / 1 Kg de alimento

Cerdos:

1 g de TILOX / 1 Lt de agua.

1 g de TILOX / 1 Kg de alimento

## 11 - Control:

Aves y Porcinos: 3 a 5 días.

## 12 - Dosis:

Cada 24 horas.

## 13 - Modo de preparación:

Diluido en el agua de bebida.

## 14- Periodo de retiro:

Porcinos: 8 días.

Carne Aves: 5 días.

## 15 - Vida útil del producto:

3 años.

## 16- Antagonismos Farmacológicos:

Reacciones de anafilácticas a individuos sensibles al antibiótico.

## 17- Conservación:

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y luz solar a una temperatura entre 15º y 30º C. Fuera del alcance de los niños.

## 18- Contraindicaciones:

Las tetraciclinas pueden influir negativamente en el crecimiento y desarrollo óseo de los animales, por los que no se debe utilizar en hembras lactantes ya que pasa en gran medida a la leche materna

## 19- REGISTRO SENASA:

F.82.70.N.0638

## 20- TITULAR:

LABORATORIOS MEDIMAXPERU E.I.R.L.