

Envidor[®] 240 SC

Spirodiclofen 251 g/L

Formulación	: Suspensión Concentrada.
Modo de Acción	: Actúa por contacto a través de los tarsos de los ácaros.
Mecanismo de Acción	: Inhibe la síntesis de los lípidos.
Toxicidad	: Ligeramente Peligroso.
Grupo Químico	: Ketoenoles

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Acaricida no sistémico, perteneciente a una nueva clase química: Ketoenoles. Presenta un excelente control de ácaros en cítricos, vid, palto y otros frutales. Controla arañitas rojas o ácaros arañas: Tetranychidae; ácaros eriófidios: Eriophyidae; ácaros blancos: Tarsonemidae. Envidor tiene un performance igual o superior a los estándares del mercado.

Indicaciones de Uso

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es aconsejable preparar una pre-mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente, luego agregar el resto de agua al tanque de aspersión.

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña por año.

Puede aplicarse en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

No presenta toxicidad al cultivo si es usado a la dosis recomendada.

Primeros Auxilios

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

Retirar las prendas contaminadas, lavar la piel con abundante agua y jabón. No usar solventes para limpiar las zonas afectadas por aumento de riesgo de intoxicación. En caso de ingestión, inducir al vómito cuando el paciente está consciente. Dar de beber mucho líquido en pocas horas para forzar la diuresis. No dar de beber a un paciente que se encuentra inconsciente. Si se han contaminado los ojos, lavara con abundante agua corriente por lo menos por 15 minutos.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico, por lo que debe seguirse un tratamiento sintomático.



Envidor[®] 240 SC

Spirodiclofen 251 g/L

Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/ha +	%		
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.6	0.03	14	0.1
	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.8	0.04	14	0.1
Palto	Arañita marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	0.4-0.6	0.02-0.03	14	0.02
Vid	Ácaro de la yema	<i>Colomerus vitis</i>	0.2-0.25	0.02-0.025	14	2
	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	-	0.05		

*PC=Periodo de carencia (días)

**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)

+ Considerando un gasto de agua de 2000 litros/ha

Envases

: Frasco x 1 L
Galonera x 5 L

Número de Registro

: PQUA N° 036 - SENASA

